

ZANÍCENÁ A SVĚDÍCÍ KŮŽE

- ATOPICKÁ DERMATITIDA
- PSORIÁZA



ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK


mavena

 SWISS MADE

Cyklus svědění a škrábání

Velmi suchá kůže představuje základní problém, který souvisí s chronickými zánětlivými onemocněními kůže.

U atopické dermatitidy nebo psoriázy je to bludný kruh.



Co je kontinuální základní léčba?


- Postižené oblasti hydratujte alespoň **2x denně**
- Aplikujte **bez vynechání** v akutní i v klidové fázi atopické dermatitidy

Kontinuální základní lokální léčba: Lepší kvalita života


- Zmírňuje svědění¹
- Zmírňuje xerózu¹
- Prodlužuje intervaly bez rekurence¹
- Omezuje použití kortikosteroidů¹
- Obnovuje bariérovou funkci kůže¹
- Má ochranné účinky u dětí s rizikem rozvoje atopické dermatitidy^{2,3}

Účinná látka vitamin B12

Vitamin B12 (kyanokobalamin) má **prokazatelné protizánětlivé účinky**. Jde o velké molekuly, které se díky patentované technologii dostanou do kůže a přímo ve stratum corneum účinně působí protizánětlivě. Vitamin B12 váže oxid dusnatý (NO) v kůži, čímž zabraňuje tvorbě (cytotoxických) peroxynitritů (ONOO⁻).



Průběh akutní fáze atopické dermatitidy



Účinnější základní léčba s vitamínem B12

Mavena B12® působí protizánětlivě, zmírňuje svědění a zarudnutí s dlouhodobým účinkem. V kombinaci s dalšími složkami, jako jsou nenasycené omega - 3 mastné kyseliny, **pomáhá obnovit narušenou kožní bariéru.**⁵⁻⁹

Jak to funguje?

Vitamin B12 (kyanokobalamin 0,7 mg/g) je silný vychytávač oxidu dusnatého a antioxidant, který brání rozvoji zánětu.

Přírodní hydratační složky a rostlinné oleje pomáhají obnovit narušenou kožní bariéru.




Tipy k základní lokální léčbě




- Součást každodenního režimu, **10 minut ráno a večer.**
- Aplikace po sprše nebo koupeli a šetrném osušení kůže.
- Lokální kortikosteroidy nebo podobné léky nanášet **až po aplikaci** základní lokální léčby.
- Možnost používání ochranných obvazů nebo speciálního oblečení.
- Dávky se měří na jednotky konečků prstů (fingertip unit, FTU), jedna FTU je přibližně 0,5 ml.
- U dospělých stačí 1 FTU na ošetřovanou oblast kůže velikosti plochy **dvou dlaní.**
- Vitamin B12 má červenou barvu, která dává produktům jejich **růžové zabarvení.** Případné barevné skvrny na oblečení je možné odstranit praním při teplotě 30 °C.

Klinické důkazy k lokální aplikaci vitamínu B12

Úleva při atopické dermatitidě u dětí po čtyřech týdnech⁴



Úleva při atopické dermatitidě u dospělých po osmi týdnech⁵



Placebo krém s červeným barvivem



Krém s obsahem 0,7 mg/g vit. B12

Mavena B12®: Základní lokální terapie zanícené a svědící kůže

Bez obsahu
parfému
a barviv



Mavena B12® AKUT GEL na léčbu akutní fáze atopické dermatitidy

na exsudantní oblasti kůže (neokluduje)

- 0,7 mg/g vitamínu B12 (kyanokobalamin)
- 0 % ury
- 0 % lipidů



Mavena B12® KRÉM na léčbu atopické dermatitidy na suché oblasti kůže

- 0,7 mg/g vitamínu B12 (kyanokobalamin)
- 1 % ury
- 24 % lipidů, například olej z rýžových otrub a bambucké máslo



Mavena B12® MAST na léčbu psoriázy na velmi suché oblasti kůže

- 0,7 mg/g vitamínu B12 (kyanokobalamin)
- 2 % ury
- 29 % lipidů, například avokádový olej a olej z chia semínek

Reference:

1. Chylla R et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2018; 16(8):976-979.
2. Simpson E et al. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134(4):818-823.
3. Horimukai K et al. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134(4):824-830.
4. Januchowski R. J Altern Complem Med. 2009; 15(4): 387-389.
5. Stücker M et al. Br J Dermatol. 2004; 150: 977-983.
6. Januchowski R. J Altern Complem Med. 2009; 15(4): 387-389.
7. Nisticò SP et al. Dermatol Ther. 2017; e12523.
8. Stücker M et al. Dermatology. 2001; 203: 141-147.
9. Del Duca E et al. Int J Immunopathol Pharmacol. 2017; 30(4): 439-444.

Všechny produkty zakoupíte v každé dobré lékárně. Více informací na www.spiridea.com.
Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02, Bratislava 3

Mavena Health Care Italia srl, Via Caradosso 18, I-20123 Milan

Čtěte pečlivě návod k použití.

spiridea